


Réapparition des symptômes sous traitement

dans la maladie de Parkinson

Important de les signaler à votre médecin rapidement

Des solutions existent

Vous prenez régulièrement votre traitement aux posologies et aux horaires indiqués par votre médecin, cependant les symptômes de la maladie de Parkinson reviennent entre 2 prises de traitement alors que ce n'était pas le cas auparavant.



Cela s'appelle les fluctuations motrices,

elles sont souvent associées à des fluctuations non motrices.



Mouvements involontaires



Tremblements, raideurs, douleurs




Modification de l'humeur ou des comportements



Anxiété

POURQUOI ?

Conséquences de l'évolution de la maladie sur le cerveau



Survenue possible d'effets indésirables dus aux traitements


Malgré l'efficacité du traitement prescrit par votre médecin, avec le temps, le nombre de neurones dopaminergiques centraux diminue (cellules du cerveau qui produisent la dopamine) ce qui perturbe l'effet des traitements dont le rôle est d'agir sur les neurones dopaminergiques.

QUE FAIRE ?



Notez sur un agenda quelques jours avant la consultation

les horaires de prises de traitement et les horaires de réapparition des symptômes



Transmettre les informations à votre neurologue

à votre neurologue



Votre médecin va réévaluer votre traitement pour limiter les fluctuations motrices

FLUCTUATIONS MOTRICES sous traitement
Parlez-en à votre médecin

Document réalisé avec le conseil scientifique du Pr Moreau, Neurologue, Centre expert Parkinson CHU Lille, Inserm U1172/Université de Lille/CHU Lille,